



ジムン[®]膀胱内注入液50% 膀胱内注入方法(一例)

医療関係者用

尿道カテーテルを膀胱内に無菌条件下で挿入し、残尿を除去する

膀胱内にカテーテルを挿入したら、外れないようにサージカルテープでカテーテルを太ももに固定

局所麻酔剤を前処置として投与する場合

尿道カテーテルから局所麻酔剤を膀胱内に投与する

麻酔剤を膀胱内に注入し、カテーテルをクレンメ(又はクリップ)で閉じて保持

局所麻酔剤を投与後、5~15分後に除去する

クレンメを開き、膀胱内から麻酔剤を除去

尿道カテーテルから、本剤50mLを膀胱内に注入する

膀胱内注入後、カテーテルを抜去する、もしくはカテーテルをクレンメで閉じる

可能な限り15分間以上膀胱内に保持する

排出する ※自然排尿もしくはカテーテルより排出

6.用法及び用量

通常、成人には50% (w/w) ジメチルスルホキシド溶液を1回あたり1バイアル50mL (ジメチルスルホキシドとして27g)、2週間間隔で6回膀胱内に注入する。なお、膀胱内注入後、可能な限り15分間以上膀胱内に保持してから排出させる。

7.用法及び用量に関連する注意

本剤による再治療は、本剤の治療により症状が改善した後、一定期間経過して治療を要する程度にまで症状が悪化した場合にのみ行うこと。

8.重要な基本的注意

投与時反応(膀胱痛、尿道痛、膀胱刺激症状、膀胱不快感等)があらわれることがあるため、必要に応じて、本剤投与前に局所麻酔剤の膀胱内注入を行った上で投与すること。